



◀ のぶどう(ぶどう科)

葉は^{さんかくけいじょう}三角形状で裂けないもの、^さ3裂するもの、^{しんれつ}深裂するものなどいろいろある。

花は^{かべん}花弁が5で^{うすみどり}淡緑色。

果実は^{かじつ}球形で^{きゆうけい}黒紫色に^{くるむらさきいろ}熟す。

花 期 7~8月

草たけ つる性の植物

生育地 荒地地, あき地

のうぜんかずら

(のうぜんかずら科)

中国原産の^{らくよう}落葉つる性木本で栽培する^{せいもくほん}が、^{さいばい}野生状のものもある。葉は^や対生し^{せいじょう}奇数羽状複葉。花は^{きすう}黄赤色で、^{うじょうふくよう}ロート形をして^{がた}いる。

花 期 7~8月

草たけ つる性で他物についてのびる

生育地 栽培



▼ ちだげざし(ゆきのした科)



多年草で^{ちよくりつ}茎は直立、^{ふくよう}葉は複葉で^{うじょう}羽状にわかれ、^{たすうあつま}たくさんの小葉がある。花は多数集って^{けい}円すい形の花序となる。淡^{かじよ}紅色5^{うす}花弁の花をつける。チ^{かべん}チタケとい^うきのこを^{さす}のに^{つごう}都合がよいのでこの名がつけられた。

花 期 7~8月 草たけ 30~80cm

生育地 田のあぜ