


ウミガメ科

アカウミガメ

学名 *Caretta caretta*

英名 Loggerhead sea turtle

- 展示場所：水生生物保全センター
- 対象：小学校
- 教科：国語
- 学年：4年下
- 出版社：東京書籍
- 大きさ：甲羅の長さ1m
- 分布：世界の熱帯、温帯域に広く分布



特徴

貝などの軟体動物を食べることが多く、他のウミガメに比べ、頭が大きく頑丈にできています。

北太平洋では、日本が唯一の産卵場となっており、中でも福島県は、アカウミガメの産卵地として最北となっています。日本での産卵時期は、八重山諸島の4月にはじまり、沖合で交尾したメスが、上陸をして産卵します。産卵数は、1回100~150個で約2ヶ月で孵化をします。同じメスが1シーズンに最高6回まで上陸した記録があります。


メジロザメ科

アカショモクザメ

学名 *Sphyrna lewini*

英名 Scalloped hammerhead

- 展示場所：黒潮大水槽
- 対象：中学校
- 教科：理科
- 学年：2分野
- 出版社：東京書籍
- 大きさ：4m
- 分布：北海道南部以南



特徴

頭部は「ハンマーヘッド」と呼ばれているように金づちのようなT字型をしています。他のシュモクザメとの違いは頭部前方の輪郭が丸いことと、同じく頭部前面中央部がへこんでいることです。大きな群れを作ることがあります。

夜間にサメ、エイ類を含む魚類やイカ、タコ類、甲殻類を食べます。